



# Legen eines peripheren Venenkatheters

## Checkliste:

- Hände-Desinfektionsmittel
- Stauschlauch
- Tupfer
- Hautantiseptikum
- Handschuhe
- Peripherer Venenkatheter (PVK), Mandarin Kunststoff-Blindverschluss
- Sterile Abdeckung (Punktionsstelle)
- Fixiermaterialien, z.B. Pflasterstreifen\*
- Flächen-Desinfektionsmittel

**Vor Patientenkontakt**

**1 Hände desinfizieren**

**Nach Ablegen der Handschuhe / nach Patientenkontakt**

**2 Antiseptik der Einstichstelle Einwirkzeit beachten**

Achten Sie besonders auf diese kritischen Momente, um Infektionen zu vermeiden.

**3 Einstichstelle anschließend nicht mehr palpieren**

**5 Steril abdecken**

**Händedesinfektion vor aseptischen Tätigkeiten**

**4 Vor dem PVK-Legen Hände desinfizieren**

\* Für bewusstseinsgestörte Patienten sollte ein transparenter Kanülenfixierverband verwendet werden, um eine visuelle Inspektion der Einstichstelle zu ermöglichen.

Hygienisch korrektes Vorgehen beugt nosokomialen Infektionen vor, an denen pro Jahr allein in Deutschland 10.000 - 15.000 Patienten versterben.